Correction du devoir surveillé numéro 7 (lundi 26/05/2025)

Exercice 1: propriété de l'espérance et de la variance (0,75 + 0,75 = 1,5 points)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes

1. Soit X et Y deux variables aléatoires **indépendantes** telles que $E(X) = 2$, $V(X) = 0,3$, $E(Y) = 1,5$ et $V(Y) = 0,2$.

$$E(3X + 2Y) = 3E(X) + 2E(Y) = 9, \quad \text{(linéarité de l'espérance)}$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 0,5 \text{ car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes}$$

$$V(4X) = 4^2 V(X) = 4,8.$$

2. Soit $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ un échantillon de taille 10 de variables aléatoires indépendantes suivant une même loi **d'espérance 2** et **d'écart type 3**. C'est-à-dire de variance $3^2 = 9$.

Soit M_{10} la variable aléatoire **moyenne** de l'échantillon.

$$E(M_{10}) = E(X) = 2.$$

$$V(M_{10}) = \frac{V(X)}{10} = \frac{9}{10} = 0,9$$

Exercice 2: inégalités de Bienaymé Tchebychev et de concentration (0,5+0,5+0,5 + 0,5+0,75+0,75= 3,5 points)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X) = 4$ et de variance $V(X) = 0,05$.

a) D'après l'inégalité de Bienaimé Tchebychev :

Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|X - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$

b) On remplace $E(X)$ par 4, $V(X)$ par 0,05 et δ par 0,5

$$P(|X - 4| \geq 0,5) \leq \frac{0,05}{0,5^2} \text{ soit } P(|X - 4| \geq 0,5) \leq 0,2$$

c) On utilise l'évènement contraire

$$1 - P(|X - 4| < 0,5) \leq 0,2$$

$$\text{Soit } -P(|X - 4| < 0,5) \leq -0,8$$

$$\text{Et donc } P(|X - 4| < 0,5) \geq 0,8$$

On en déduit que $P(3,5 < X < 4,5) \geq 0,8$

2. Soit une variable aléatoire X d'espérance $E(X) = 5,2$ et de variance $V(X) = 0,3$.

On considère un échantillon de n variables aléatoires suivant la loi de X .

On appelle M_n la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon.

a) D'après l'inégalité de concentration :

Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n \delta^2}$$

b) On remplace $E(X)$ par 5,2, $V(X)$ par 0,3 et δ par 0,2

$$P(|M_n - 5,2| \geq 0,2) \leq \frac{0,3}{n \cdot 0,2^2}$$

$$\text{Soit } 1 - P(|M_n - 5,2| < 0,2) \leq \frac{7,5}{n}$$

$$\text{D'où } -P(|M_n - 5,2| < 0,2) \leq -1 + \frac{7,5}{n}$$

$$\text{Et } P(|M_n - 5,2| < 0,2) \geq 1 - \frac{7,5}{n}$$

c) Il suffit de résoudre l'inéquation $1 - \frac{7,5}{n} \geq 0,95$.

$$\text{Soit } -\frac{7,5}{n} \geq -0,05 \text{ et donc } \frac{7,5}{n} \leq 0,05.$$

Par passage à l'inverse, $\frac{n}{7,5} \geq \frac{1}{0,05}$ soit encore $n \geq \frac{7,5}{0,05}$ soit $n \geq 150$.

La probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]5; 5,4[$ est supérieure à 0,95 lorsque $n \geq 150$.

Exercice 3: valeur moyenne d'une fonction (0,75+0,75=1,5 points)

1. Soit f la fonction définie sur $[0 ; 5]$ par $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

f est continue sur $[0 ; 5]$ donc admet des primitives. Une primitive de f est la fonction F .

- $f = \frac{1}{2} \frac{u'}{u}$
- $u(x) = x^2 + 1 \quad u'(x) = 2x \quad \left(\frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2+1}\right)$
- $F = \frac{1}{2} \ln(u)$

Pour tout réel x de $[0 ; 5]$, $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$

$$\int_0^5 \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right]_0^5 = \frac{1}{2} \ln(5^2 + 1) - \frac{1}{2} \ln(0^2 + 1) = \frac{1}{2} \ln(26)$$

2. La valeur moyenne de la fonction f définie sur $[0 ; 5]$ par $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ est

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{5-0} \int_0^5 f(x) dx = \frac{1}{10} \ln(26)$$

Exercice 4: suite d'intégrale (0,5+0,75+0,75+0,75=3,5 points)

On considère la suite d'intégrales (u_n) définie pour tout entier n , par $u_n = \int_0^1 x^n e^x dx$

1. $u_0 = \int_0^1 x^0 e^x dx = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$.
2. Pour tout entier naturel n ,
Pour tout réel x de $[0 ; 1]$, $e^x \geq 0$ et $x^n \geq 0$.
On en déduit que $x^n e^x \geq 0$
Par positivité de l'intégrale, on en déduit que $\int_0^1 x^n e^x dx \geq 0$.
Ainsi, $u_n \geq 0$.
3. Pour tout entier naturel n ,
$$u_{n+1} - u_n = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx - \int_0^1 x^n e^x dx$$
$$= \int_0^1 (x^{n+1} e^x - x^n e^x) dx \quad (\text{par linéarité de l'intégrale})$$
$$= \int_0^1 (x-1)x^n e^x dx.$$
4. Pour tout entier naturel n ,
Pour tout réel x de $[0 ; 1]$, $x^n e^x \geq 0$ et $x-1 \leq 0$
On en déduit que $(x-1)x^n e^x \leq 0$
Par positivité de l'intégrale, on en déduit que $\int_0^1 (x-1)x^n e^x dx \leq 0$.
Et donc que $u_{n+1} - u_n \leq 0$
On en déduit que la suite (u_n) est décroissante.
5. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 alors d'après le théorème de convergence des suites monotones, la suite (u_n) converge.

Exercice 5: D'après Amérique du Nord 2025 (2 + 0,5 + 1 = 3,5 points)

1. Soit la fonction f définie sur $[0 ; \pi]$ par $f(x) = e^x \sin(x) + x$.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère.

On admet que f est positive sur $[0 ; \pi]$.

On note :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx.$$

1. En intégrant par parties l'intégrale I de deux manières différentes, établir les deux relations suivantes :

$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

On pose : $v(x) = \sin(x) \rightarrow v'(x) = \cos(x)$

$$u'(x) = e^x \rightarrow u(x) = e^x$$

u et v deux fonctions dérivables sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ de dérivées continues sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ainsi, en intégrant par parties, on a :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} u(x)v'(x) dx \\ &= [e^x \times \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \times \cos(x) dx \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - e^0 \sin(0) - J \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - J \end{aligned}$$

On pose : $v(x) = e^x \rightarrow v'(x) = e^x$

$$u'(x) = \sin(x) \rightarrow u(x) = -\cos(x)$$

u et v deux fonctions dérivables sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ de dérivées continues sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ainsi, en intégrant par parties, on a :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} u(x)v'(x) dx \\ &= [-e^x \times \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \times -\cos(x) dx \\ &= -e^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + e^0 \cos(0) + J \\ &= 1 + J \end{aligned}$$

2. On a le système $\begin{cases} I = 1 + J \\ I = e^{\frac{\pi}{2}} - J \end{cases}$ soit $\begin{cases} I = 1 + J \\ 1 + J = e^{\frac{\pi}{2}} - J \end{cases}$ soit $\begin{cases} I = 1 + J \\ 2J = e^{\frac{\pi}{2}} - 1 \end{cases}$ soit $\begin{cases} I = 1 + \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2} = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2} \\ J = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2} \end{cases}$

3. L'aire du domaine compris entre les courbes de f , les courbes de g et les droites d'équation $x=0$ et $x=\frac{\pi}{2}$ est :
(il est admis que C_f est au dessus de C_g)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x) - g(x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x \sin(x) + x - x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}$$

ANNEXE (exercice 5)

Exercice 6: Amérique du Nord 2025 (A : 0,5 + 1+0,5+0,5+1,5 B : 1,5+1,5 = 7 points)

Partie A

On note N la variable aléatoire qui donne le nombre de paniers marqués.

Les résultats des probabilités demandées seront, si nécessaire, arrondis au millièm.

1. L'épreuve est effectuée 15 fois de façon indépendante et à chaque lancer la probabilité de marquer est égale à 0,32. N suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(15 ; 0,32)$.
2. La probabilité que Victor réussisse exactement 4 paniers est :

$$P(N = 4) = \binom{15}{4} \times 0,32^4 \times (1 - 0,32)^{15-4} \approx 0,206$$
 au millièm près.
3. La probabilité que Victor réussisse au plus 6 paniers est :

$$P(N \leq 6) = P(N = 0) + P(N = 1) + \dots + P(N = 6) \approx 0,828$$
 (calculatrice).
4. On sait que : $E(N) = n \times p = 15 \times 0,32 = 4,8$.
Donc en moyenne sur 150 lancers, Victor marque 48 paniers.

5. a. Chaque lancer étant à 3 points, on a donc $T = 3N$.
- b. On a $E(T) = E(3N) = 3E(N)$ d'après la linéarité de l'espérance, soit $E(T) = 3 \times 4,8 = 14,4$, donc une moyenne de 144 points marqués sur 150 lancers.
- c. On a $P(12 \leq T = 3N \leq 18) = P(4 \leq N \leq 6)$.
 Cette probabilité est égale à :
 $P(4 \leq N \leq 6) = P(N = 4) + P(N = 5) + P(N = 6) \approx 0,206 + 0,213 + 0,167$, soit

$$P(12 \leq T \leq 18) \approx 0,586.$$

Partie B

1. Dans cette question, on prend $n = 50$.

- a. M_{50} représente la moyenne empirique, sur 50 matchs, des points marqués par Victor
- b. • Chaque variable $X_1, \dots, X_{50}$ suit la même loi que X donc on a :
 $E(M_{50}) = E(X) = 22$;
 • Comme les variables $X_1, X_2, \dots, X_{50}$ sont indépendantes, on en déduit :
 $V(M_{50}) = \frac{1}{50} V(X) = \frac{1}{50} \times 65 = \frac{65}{50} = \frac{130}{100} = 1,3$.

c) D'après l'inégalité de concentration :

Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n \delta^2}$$

On remplace n par 50, $E(X)$ par 22, $V(X)$ par 65 et δ par 3

$$P(|M_{50} - 22| \geq 3) \leq \frac{65}{50 \times 3^2}$$

$$\text{soit } P(|M_{50} - 22| \geq 3) \leq \frac{13}{90}$$

$$\text{d) Soit } 1 - P(|M_{50} - 22| < 3) \leq \frac{13}{90}$$

$$\text{D'où } -P(|M_{50} - 22| < 3) \leq -\frac{77}{90}$$

$$\text{Et } P(|M_{50} - 22| < 3) \geq \frac{77}{90} \text{ or } \frac{77}{90} > 0,85$$

On en déduit que $P(19 < M_{50} < 25) > 0,85$.

2. D'après la loi des grands nombres :

Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq \delta) = 0$$

Soit en remplaçant δ par 3

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - 22| \geq 3) = 0 \quad \text{L'affirmation est donc fausse.}$$

Autre méthode :

D'après l'inégalité de concentration :

Pour tout réel strictement positif δ , on a :

$$P(|M_n - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{n \delta^2}$$

On remplace $E(X)$ par 22, $V(X)$ par 65 et δ par 3

$$P(|M_n - 22| \geq 3) \leq \frac{65}{n \times 3^2}$$

$$\text{soit } P(|M_n - 22| \geq 3) \leq \frac{65}{9n}$$

$$\text{On veut donc que : } \frac{65}{9n} \leq 0,01$$

$$\text{On trouve } \frac{9n}{65} \geq 100 \text{ soit } n \geq \frac{6500}{9} \text{ et donc } n \geq 723$$